

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

### 33. ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ

*Anemone sylvestris* L. 1753

**Семейство:** Лютиковые –  
*Ranunculaceae*

**Категория и статус:** 3 «Редкий» – 3, РД. Бореальный вид, имеющий значительный глобальный ареал, находящийся в КК на границе распространения, оторванный от основной части ареала.



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

#### **Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

#### **Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Не принадлежит.

#### **Краткая морфологическая характеристика**

Травянистый поликарпик с вертикальным корневищем, часто с многочисленными корневыми отпрысками. Стебли прямостоячие, простые, беловолючные. Высота – до 50 см. Стеблевые листья в мутовке по 3, черешковые, 2–3-раздельные, опушенные. Прикорневые листья длинночерешковые, пластинки их в очертании округлые, пальчато-рассеченные, с 5–3 ромбическими или клиновидно-ромбическими надрезанными долями [1]. Цветки одиночные, диаметром 3–7,5 см, на длинных цветоносах, часто поникающие. Околоцветник простой, листочки его (по происхождению чашелистики), обычно в количестве 5 штук, белые или кремовые, иногда оттененные сиреневым цветом, снаружи опушенные. Плоды многочисленные, густо опушенные длинными белыми волосками [2].  $2n=16$ .

#### **Распространение**

Общий ареал: Европа: Средняя, Атлантическая; Средиземноморье (восток); Азия: Монголия (север), Северо-Восточный Китай, Средняя (северо-восток) [3]. Россия: Европейская часть (Ленинградская, Новгородская, Псковская обл.) [4]; Дальний Восток; Западная и Восточная Сибирь [2]; Кавказ (в т. ч. Центрально-Эльбрусский, Кубанский, Кисловодский, Терский, Дагестанский, Центрально-Дагестанский р-ны) [5]. Краснодарский край: Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-н (хр. Герпегем (31.V.2000) [6, 7], хр. Гуама [8]);

Уруп-Тебердинский р-н (р. Уруп в окр. ст. Отрадной (14.IX.1960, Доровская), с. Грушки (12.VI.1956, Костычев) [9]).

#### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Цветет в мае – июне. Мезофит, гемикриптофит, сциогелиофит. Размножается семенами и вегетативно (корневыми отпрысками). Анемохор. Растет на травянистых склонах, лесных полянах, опушках нижнегорного пояса. На хр. Герпегем встречается как на открытых луговых склонах, так и под пологом разреженных дубняков [7].

#### **Численность и ее тенденции**

Произрастает одиночными экземплярами и небольшими группами [7]. На хр. Гуама отмечены одиночные особи, на хр. Герпегем популяция полночленная, численность достигает 5000 особей (14.V.2007); численность на 1 м<sup>2</sup> в местах компактного произрастания составляет от 12 до 29 особей [8].

#### **Лимитирующие факторы**

Естественно редкий вид на границе ареала. Численность сокращается в связи со сбором цветущих растений.

#### **Меры охраны**

Необходима организация ботанического памятника природы на хр. Герпегем [6]. Вне региона охраняется в Ростовской обл. [10]. Необходимы изучение структуры популяций, динамики численности, поиск новых мест обитания в регионе.

#### **Источники информации**

1. Талиев, 1941; 2. Головкин и др., 1986; 3. Флора Восточной Европы, 2001; 4. Цвелев, 2000; 5. Галушко, 1978; 6. Тимухин, 2001d; 7. Данные составителей; 8. Личное сообщение, С. А. Литвинская; 9. КВАИ; 10. Красная книга РО, 2004.

#### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото С. А. Литвинская.