

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

77. ЛАДАННИК ШАЛФЕЕЛИСТНЫЙ

Cistus salvifolius L. 1753

Семейство: Ладанниковые – *Cistaceae*

Категория и статус: 1 «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. Локально встречающийся реликтовый восточно-средиземноморский вид с низкой численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории редкости «Находящаяся в опасном состоянии» – Endangered, EN C2a(i); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Кустарник. Высота – до 1 м. Листья эллиптически- или яйцевидно-продолговатые, неправильно-городчатые, суженные в короткий черешок, сверху морщинистые, более или менее густо опушенные звездчатыми волосками. Цветки одиночные или по 2–3. Лепестки обратно-клиновидно-яйцевидные, белые, с желтым пятном при основании, при сушке желтеющие. Чашелистики широкояйцевидные, туповатые, серые от звездчатого опушения. Коробочка густоопушенная [1,2].

Распространение

Общий ареал: Европа: Южная, Юго-Восточная, Восточная (Крым, ЮБК); Средиземноморье; Юго-Западная Азия (Турция, север Ирана); Кавказ (Западное Закавказье) [3]. Россия: Северный Кавказ (КК). Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (р-н Большого Сочи, окр. пос. Чемитоквадже (18.V.2004) [4]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в мае – июне, плодоносит в августе [4]. Энтомофил. Сциогелиофит. Декоративен. Медонос. Смолонос [2]. Произрастает на каменистых приморских склонах южной экспо-

зии в нижнем горном поясе. Встречается в составе разреженных дубовых и пицундско-сосновых лесов [4].

Численность и ее тенденции

В двух известных небольших по площади локалитетах насчитывается около 1,5 тыс. особей.

Лимитирующие факторы

Естественно редкий вид, страдающий от низовых пожаров, обламывания ветвей в период цветения.

Меры охраны

Охраняется на территории СНП, оба локалитета рекомендованы к заказному режиму охраны [4]. Необходимы контроль за состоянием популяций, ограничение хозяйственной деятельности в местах произрастания, изучение биологии и экологии вида в регионе, запрещение сбора вида в естественных условиях, разведение вида в питомниках с последующей реинтродукцией в природу. Вне региона охраняется в Пицундо-Мюссерском заповеднике [5].

Источники информации

1. Имханицкая, 1981; 2. Колаковский, 1980; 3. Меницкий, 1999; 4. Данные составителей; 5. Колаковский, Яброва-Колаковская, 1981.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото Б. С. Туниев.