

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

Отдел: ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – POLYPODIOPHYTES

Класс: Папоротниковидные - Polypodiopsida

**3. ПТЕРИС КРИТСКИЙ**

*Pteris cretica* L. 1767

**Семейство:** Птерисовые – *Pteridaceae*

**Категория и статус:** 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Реликтовый средиземноморский [1] спорадично распространенный вид с ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся численностью.



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

**Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU A2c; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

**Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**  
Не принадлежит.

**Краткая морфологическая характеристика**

Травянистый поликарпик. Корневище ползучее, с бурыми пленками. Листья однажды перистые, с нижними сегментами, часто рассеченными еще вторично. Сегменты супротивные. Междукраевые анастомозы жилок наблюдаются только у плодущих листьев. Спороносные листья обычно в 2 раза длиннее вегетативных (до 100 см длиной), сегменты их узколинейно-ланцетные, цельнокрайние; вегетативные листья длиной до 70 см, с сегментами более широкими, линейно-ланцетными, по краю курчавыми и острозубчатыми. Сорусы линейные, прикрытые завороченным краем сегмента [2–4].

**Распространение**

Общий ареал: Юго-Восточная Европа; Средиземноморье; Юго-Западная (Турция, Иран, Сирия) и Южная Азия; Центральная Африка; Кавказ (Западное Закавказье, Талыш) [2].  
Россия: КК. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (ущелье р. Восточный Дагомыс, окр. пос. Большой Кичмай [5], ущелье Чудо-Красотка, Якорная Щель, ущелья рр. Кудепста, Сочи, Мзымта, Агурское ущелье, Ахцу, Глубокий Яр (бас. р. Мзымта) [6]).

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Спороношение в июле – августе. Мезофит, сциофит, мезотерм. Растет в нижнем горном поясе в колхидских лесах, особенно часто встречается во влажных долинных лесах и на всевозможных затененных влажных участках. Декоративен.

### **Численность и ее тенденции**

Чаще встречается единичными экземплярами, реже небольшими группами – до 50 особей [6].

### **Лимитирующие факторы**

Естественно редкий вид на границе ареала.

### **Меры охраны**

Охраняется в СНП. Необходимо изучение ареала вида, условий произрастания, популяционной структуры, создание ботанического памятника природы в ущелье Якорная щель [6].

### **Источники информации**

1. Фомин, 1934; 2. Кудряшова, 2000; 3. Гроссгейм, 1939; 4. Конспект... 2003; 5. Тимухин, 2006b; 6. Данные составителей.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото С. А. Литвинская.