

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 1

Введение

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012

БЕЗВРЕМЕННОК ТЕНЕВОЙ

Colchicum umbrosum Stev., 1829



Систематическое положение

Семейство: Безвременниковые – Melanthiaceae.

Категория и статус

2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к категории 2 – средиземногорный, крымско-кавказско-малоазийский, [7]. В Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП


Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab(i,ii,iv); И.Н. Тимухин, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.



Краткое морфологическое описание

Многолетник. Клубнедуковица почти шаровидная, 15 – 20 см в диаметре, одетая черно-коричневыми влагалищами, переходящими в длинную трубку. Листьев 3 – 5, линейно-ланцетных, появляющихся после цветения весной на следующий год. Цветков 1 – 5. Доли отгиба околоцветника эллиптически-ланцетные, лиловые или бледно-пурпурные, до 20 мм длиной. Коробочка продолговатая, заостренная [1, 3, 4].

Распространение

Общий ареал: север Малой Азии, южный берег Крыма, Кавказ [3, 4]. Россия: РА, СК и КК [3]. Адыгея: окр. Майкопа, хр. Азиш-Тау, хр. Унакоз [6], окр. Гузерипля, ст. Хамышки, Хамышинские поляны [10]; р. Желобная, устье р. Молчепа [11]; долина р. Сахрай [9]; Майкопский р-н, окр. пос. Трехречный; Тахтамукайский р-н, окр. х. Красноармейский [2].

Особенности биологии и экологии

Лесной, мезофильный. Растет на тенистых лужайках, среди кустарников и на опушках от нижнего до среднего горного пояса [3]. Встречается также по послелесным полянам, в широколиственных лесах, преимущественно грабовых [8]. Цветет в июле – октябре. Листья и семена развиваются весной, семена прорастают осенью, но развитие проростков продолжается несколько лет; зацветает на 4 год после прорастания. Размножение только семенное. Декоративен. Ядовит [1, 3, 4].

Численность и ее тенденции

Встречается изредка, иногда довольно крупными группами [8]. В окр. кордона Гузерипля отмечали единичные особи [11]; в предгорной части Адыгеи численность не превышает 10 экз. на 10 м² [2].

Лимитирующие факторы и угрозы

Интенсивное освоение предгорий.

Необходимые меры охраны

Охраняется на территории КГПБЗ. Необходим постоянный контроль над состоянием ценопопуляций.

Источники информации

1. Галушко, 1978;
2. Загурная, 2010;
3. Колаковский, 1986;
4. Косенко, 1970;
5. Красная книга КК, 2007;
6. Красная книга РА, 2000;
7. Красная книга РФ, 2008;
8. Тимухин, 2002;
9. Otte, Frosch, 2007;
10. Гербарий КГПБЗ;
11. Данные составителей.

Составители

И.Н. Тимухин,
Б.С. Туниев.