

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

## 229. ПОДСНЕЖНИК ПЛОСКОЛИСТНЫЙ *Galanthus platyphyllus* Traub et Moldenke, 1947

**Семейство:** Амариллисовые –  
*Amaryllidaceae*

**Категория и статус:** 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Редкий локально встречающийся закавказский эндемичный вид с сокращающейся численностью. Красная книга РФ – категория статуса 3.



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

### **Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU D2; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

### **Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) (2006) [1].

### **Краткая морфологическая характеристика**

Травянистый луковичный поликарпик. Высота – 10–20 см. Луковицы около 4–5 см длиной и 2,5–3 см в диаметре. Влагалище 3–5 см длиной. Листья плоские, продолговато-ланцетные, темно-зеленые, блестящие, до 3 см шириной, во время цветения 15–16 см длиной и 1–1,5 см шириной, после цветения 20–25 см длиной и 3–3,5 см шириной. Цветонос 10–15(20) см длиной, после цветения – 20–22 см; крыло 3–5 см длиной; цветоножка 1,5–2 см длиной. Наружные листочки околоцветника 15–20 мм длиной, узкоэллиптические, внутренние – до 7 мм длиной, клиновидносуженные, на верхушке округленные или слегка выемчатые, с мелким зеленым пятнышком или без него. Тычинки 0,4–0,5 см длиной; пыльники тупые, на верхушке без острия. Завязь 0,3–0,4 см в диаметре.  $2n=24$  [2–5].

### **Распространение**

Общий ареал: Кавказ (Грузия) [7]. Россия: Северный Кавказ: КК; Северная Осетия – Алания [2]. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (хр. Ачишко [6–10] (30.VI.1995, А. Солодыко) [11]). Ближайшее место произрастания вида в Абхазии расположено в долине р. Ауадхара, в непосредственной близости от государственной границы с Россией, что позволяет предположить возможное нахождение вида также в бас. верхнего течения р. Мзымта (хр. Ацетука, рр. Тихая, Синеокая) [9].

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Цветет в мае, семена созревают в июне [4, 6, 7]. Размножается вегетативно и семенами. Мезофит, сциогелиофит, криптофит. Произрастает в субальпийском и альпийском поясах.

### **Численность и ее тенденции**

Локально обилен, но площадь произрастания в крае невелика.

### **Лимитирующие факторы**

Естественно редкий вид, сбор на букеты.

### **Меры охраны**

Охраняется в СНП, необходимы заказной режим охраны горы Ачишхо [12], контроль за состоянием популяций.

### **Источники информации**

1. [www.cites.org](http://www.cites.org), 14.06.06; 2. Абрамова и др., 1977; 3. Галушко, 1978; 4. Колаковский, 1986; 5. Косенко, 1970; 6. КККК, 1994; 7. Красная книга РСФСР, 1988; 8. Тимухин, 2002а; 9. Тимухин, Туниев, 2002; 10. Туниев, Тимухин, 2001; 11. Артюшенко, Мордак, 2006; 12. Данные составителей.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото И. Н. Тимухин.