

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

103. ЛАПЧАТКА КАМИЛЛЫ

Potentilla camillae Kolak. 1936

Семейство: Розовые – *Rosaceae*

Категория и статус: 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Западно-закавказский эндемичный вид с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью, находящийся в Краснодарском крае на границе локального ареала.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории редкости «Уязвимая» – Vulnerable, VU D1; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый короткокорневищный поликарпик. Корневище коротко разветвленное, густо одетое темно-красно-бурыми черешками и чешуевидными прилистниками. Листья тройчатые с удлинено-эллиптическими или, реже, удлинено-обратно-яйцевидными, на верхушке с 3–7-зубчиками, листочки до 23–35 мм длиной, верхняя поверхность их голая или почти голая, а нижняя – прижато-серебристо-опушенная, гладкая, без выдающихся жилок. Цветоносные стебли слабые, в 2–3 раза превышающие лист, малоцветковые. Чашелистики эллиптически-ланцетные, коротко опушенные, 6–7 мм длиной. Лепестки яйцевидно-округлые, на верхушке выемчатые, распростертые, белые, около 8 мм длиной. Цветоложе шаровидное, опушенное. Плодики удлинено-яйцевидные, длиннореснитчатые. Столбик нитевидный, прикреплен чуть выше середины плодика. Рыльце острое [1].

Распространение

Общий ареал: Кавказ: Абхазия (гора Дзашра (29.VII.1935, А. Колаковский) [2], долина р. Югшара (16.VIII.1936, Захарова) [3], между 19-м км и оз. Рица (16.VIII.1936, А. Колаковский) [4], Мегрельский хр., плато Асхи (6.VII.1947) [2, 4], ущелье р. Джоноула (28.VII.1980, Мукбаиани, Капанадзе) [2], истоки р. Белой (Хипста) [1, 5]. Россия: КК. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (ущелье р. Псоу) [6, 7].

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в июле – августе, плодоносит в сентябре [7]. Произрастает в трещинах отвесных известняковых скал, обычно в тенистых ущельях, до 500 м над у. м. [7].

Численность и ее тенденции

Встречается единичными особями.

Лимитирующие факторы

Естественно редкий угнетенный узкоэндемичный вид, низкая плотность популяций, узкая экологическая амплитуда.

Меры охраны

Охраняется на территории СНП. Необходимы дополнительные поиски в природе, изучение географии, биологии и экологии вида, состояния популяций и контроль за ними, искусственное разведение вида с последующей интродукцией [7].

Источники информации

1. Колаковский, 1985; 2. Гербарий Института ботаники Грузии; 3. LE; 4. Адзинба, 1987; 5. Колаковский, 1937; 6. Солодько, 2000; 7. Данные составителей.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская