

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

61. ХУРМА ОБЫКНОВЕННАЯ

Diospyrus lotus L. 1753

Семейство: Эбеновые – *Ebenaceae*

Категория и статус: 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Реликтовый вид с сокращающейся численностью и ограниченным числом локалитетов. Красная книга РФ – категория статуса 3, Красная книга СССР – «Вид с сокращающейся численностью».



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» — Vulnerable, VU A1c; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Листопадное дерево. Высота – до 25 м. Ствол искривленный, покрытый темно-серой трещиноватой корой и светло-коричневыми молодыми ветвями. Листья плотные, лоснящиеся, на толстых коротких густоопушенных черешках, продолговато- или широкоэллиптические, длиной 5–14 см и шириной 2,5–6 см, сверху ярко-зеленые, голые или с рассеянными волосками. Цветки пазушные, обычно одиночные, на коротких цветоножках. Чашечка при плоде сильно разрастающаяся, 4-лопастная; лопасти коротко-треугольные, острые. Венчик желтовато-красный колокольчато-кувшинчатый с округлыми долями отгиба. Плод – мясистая шаровидная ягода диаметром 1–2 см, в зрелом состоянии темно-бурая с сизым налетом [1–3].

Распространение

Общий ареал: Азия: Юго-Западная (Турция, Иран, Афганистан), Средняя (Копетдаг, Дарвазский и Гиссарский хр.), Центральная (северо-западная Индия), Северный Китай, Япония [4]; Кавказ (Закавказье). Россия: Северный Кавказ (КК; Дагестан) [4]. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н: Черноморское побережье [4, 5], рр. Восточный и Западный Дагомыс, Сочи, Чухутх, Чимит, подъем на Орлиные скалы, тиссо-самшитовая роща [6–8].

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Двудомное. Цветет в мае – начале июня. Плодоносит в конце октября – ноябре. Плод включает в себе от 2 до 8 полулунных семян. Размножается семенами, корневыми отпрысками, пневой порослью. Орнитохор, антропохор. Мезофит (влаголюбив, но заболоченных мест не переносит), сциогелиофит [9]. Мезотерм, но выдерживает морозы до -20°C . Растет в нижнем и среднем горных поясах на высоте до 2000 м над у. м., в условиях Сочи выше 600 м над у. м. не обнаружен [8]. Встречается по скалистым склонам, в ущельях, вблизи родников, в чистых насаждениях и сообществах с алычой и другими породами [1, 4, 5]. Нередко сопутствует лапине крылоплодной в приречных лесах [8]. Ассектатор смешанных колхидских лесов.

Численность и ее тенденции

Встречается единичными особями. В тиссосамшитовой роще КГПБЗ обнаружен 1 экз.

Лимитирующие факторы

Рекреационное и хозяйственное освоение речных долин и предгорий Сочи.

Меры охраны

Охраняется на территории СНП. Необходимы усиленные поиски в природе, изучение географии, биологии, экологии вида, регулярный контроль за состоянием популяций, закладка питомников по выращиванию вида с последующей реинтродукцией в природу [8].

Источники информации

1. Бородина и др., 1966; 2. Колаковский, 1982; 3. Косенко, 1970; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 5. Красная книга СССР, 1984; 6. Тимухин, 2002а; 7. Туниев, Тимухин, 2001; 8. Данные составителей; 9. Литвинская, 2006.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.