

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

96. ВИШНЯ МАГАЛЕБСКАЯ

Padellus mahaleb (L.) Vass. 1973 [= *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. 1759]

Семейство: Розовые – *Rosaceae*

Категория и статус: 5 «Недостаточно изученный» – 5, НИ. Спорадично распространенный средиземноморский вид с ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Недостаточно данных» – Data Deficient, DD; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Листопадный кустарник, редко дерево. Высота – до 13 м. Крона густая, иногда несколько поникающая. Кора буроватая. Листья в почкосложении вдоль сложенные. Листья широкояйцевидные, при основании слегка сердцевидные, коротко заостренные, городчатопильчатые, голые. Цветки в укороченных кистях в виде щитка распускаются после появления листьев. Лепестки белые, продолговатые, около 7 мм длиной. Чашелистиков и лепестков по 5. Тычинок много, цветоложе коническое. Костянка небольшая гладкая, без налета, с почти шаровидной косточкой [1, 2]. $2n=16$.

Распространение

Общий ареал: Европа: Средняя (юг), Восточная (Молдова, Украина с Крымом); Средиземноморье; Азия: Юго-Восточная, Средняя (горный Туркменистан, Памироалай, Тянь-Шань); Кавказ (Армения, Грузия, Азербайджан) [3]. Россия: Европейская часть (Ленинградская обл.) [3]; Северный Кавказ: Дагестан (долина реки между г. Буйнакском и с. Нижнее Казанище (9.VI.1961, Н. Цвелев) [4]; КК [5]. Краснодарский край: Северо-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-н (окр. г. Геленджика (11.V.1996) [6]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (окр. курортных пос. Аше, Солоники, Чемитоквадже) [5].

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Летне-зеленое. Цветет в апреле [5], энтомофил. Размножается семенами. Зоохор, орнитохор. Мезотерм, гелиофит, ксеромезофит. Растет на каменистых склонах, среди кустарников, в светлых лиственных лесах ниже- и среднегорного поясов. Медонос. Декоративное [1, 2, 7].

Численность и ее тенденции

В окр. пос. Аше произрастает около 60 экз. на площади 1 га и формирует кустарниковую ассоциацию. В окр. пос. Солоники встречается в подлеске пицундской сосны единичными экземплярами и группами до 10 особей. В окр. курортного пос. Чемитоквадже имеется локальная группа.

Лимитирующие факторы

Хозяйственное освоение нижнего горного пояса ЧПК, низкая плотность популяций.

Меры охраны

Охраняется в СНП. Урочище «Солоники» СНП необходимо перевести в особо охраняемую зону [8]. Рекомендовался к внесению в Красную книгу РФ [9].

Источники информации

1. Алексеев и др., 1997; 2. Гроссгейм, 1949; 3. Цвелев, 2000; 4. LE; 5. Данные составителей; 6. Зернов, 2000; 7. Гроссгейм, 1952; 8. Тимухин, 2001b; 9. Тимухин, 2000a.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.