

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

218. КАСАТИК КОЛХИДСКИЙ

Iris colchica Kem.-Nath. 1938

Семейство: Касатиковые – *Iridaceae*

Категория и статус: 3 «Редкий» – 3, РД. Эндемичный кавказский спорадично распространенный вид с ограниченным количеством мест произрастания и сокращающейся численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый корневищный поликарпик. Высота – до 30 см. Корневище ползучее, ветвистое. Стебли сплюснутые, с узкокрылатыми ребрами. Листья линейные или линейно-мечевидные, слабосерповидно изогнутые, до 15 мм шириной, обычно длиннее стебля. Цветки на вершине стебля по 1–2 шт. Наружные листочки околоцветника удлинненно-продолговатые, без перетяжки между ноготком и пластинкой, по краю и на конце фиолетовые, посередине со светло-желтой полоской и фиолетовыми жилками, до 5 см длиной и 15–17 мм шириной. Внутренние листочки околоцветника немного короче наружных, продолговатые, книзу быстросуженные в ноготок. Коробочка на длинной ножке, овальная или продолговато-яйцевидная, по граням почти крылатая [1–3].

Распространение

Общий ареал: Кавказ. Россия: КК. Краснодарский край: Западный Кавказ: Адагум-Пшишский р-н [4]; Бело-Лабинский р-н (изолированное местообитание в Мостовском р-не – балка Капустина [5]); Северо-Западное Закавказье [4]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (окр. г. Сочи – гора Большой Ахун, тиссосамшитовая роща, Ахштырское ущелье, окр. пос. Аше [6]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в июне, плоды созревают в июле. Энтомофил. Криптофит. Скально-лесной, альпийский, известняковый вид [2]. Автохтонный ассектатор петрофитных группировок. Рас-

тет в светлых лесах, среди кустарников, на открытых, обычно каменистых, склонах лесного и нижнеальпийского поясов. Эколого-фитоценологическая амплитуда – стенотопная.

Численность и ее тенденции

Встречается единичными экземплярами. Тенденции динамики численности неизвестны.

Лимитирующие факторы

Сбор цветущих растений, интенсивное освоение предгорий Сочи.

Меры охраны

Охраняется в КГПБЗ (тиссосамшитовая роща) и СНП. Необходимы контроль за состоянием популяций, изучение биологии, экологии вида, организация памятника природы в балке Капустина [5].

Источники информации

1. Галушко, 1978; 2. Колаковский, 1986; 3. Косенко, 1970; 4. Михеев, 2006; 5. Тимухин, 2001; 6. Данные составителей.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото Б. С. Туниев.