

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007


137. СВИДИНА КЕНИГА, КИЗИЛ КЕНИГА

Swida koenigii (Schneid.)

Pojark. ex Grossh. 1949

Семейство: Кизиловые – *Cornaceae*

Категория и статус: 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Спорадично распространенный в небольшом числе мест эндемичный вид с сокращающейся численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU A2cd; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Листопадное дерево или кустарник. Высота – до 4 м. Листорасположение супротивное; листья крупные, яйцевидные по форме, на черешках; длина их 10–20 см, ширина – 10 см; пластинки с обеих сторон волосистые, жилок обычно 5–6 пар. Цветки обоеполые, собраны в щитковидные соцветия, оберток нет, лепестки белые, ланцетные, с короткими волосками у основания, нити тычинок короче лепестков и столбика. Плоды – шаровидные костянки черного цвета; косточка приплюснутая, с 8 бороздками [1, 2].

Распространение

Общий ареал: Кавказ (Абхазия). Россия: Северный Кавказ: КК. Краснодарский край: Северо-Западное Закавказье: Пшадско-Дзубгский р-н (между г. Лысая и Ага) [3]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (бас. р. Шахе при подъеме от кордона Бабук-Аул на Черкесский пер. [4], ущелье Ахцу, Шахгинское ущелье р. Псоу [5]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Летне-зеленое. Цветет в мае – июне, плодоносит в сентябре – ноябре. Размножается семенами и вегетативно. Энтомофил, орнитофил, сциофит, мезофит. Растет на различных почвах, но предпочитает хорошо увлажненные, глубокие. Тип поясности: нижнегорный, доходит до среднего и верхнелесного горных поясов. Ассектатор подлеска дубовых, дубово-грабовых и буковых сообществ. Произрастает в лесах, по опушкам, берегам рек, на полянах, на открытых склонах, в ущельях. Средиземногорный, колхидский с иррадиациями, лесной, мезофильный. Медонос. Декоративен [1, 2].

Численность и ее тенденции

Встречается единичными экземплярами. Общая численность в РФ не превышает 1000 экз.

Лимитирующие факторы

Строительство автомагистрали Адлер – Красная Поляна, рекреационное освоение предгорий г. Сочи.

Меры охраны

Охраняется на территории СНП и КГПБЗ. Известные места произрастания рекомендованы к заказному режиму охраны [6]. Рекомендовался к включению в Красную книгу РФ [6]. Необходимы контроль за состоянием популяций, изучение географии вида, уточнение ареала.

Источники информации

1. Колаковский, 1982; 2. Косенко, 1970; 3. Зернов, 2000; 4. Тимухин, 2001а; 5. Данные составителей; 6. Тимухин, 2000а.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.