

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

**35. ЖИВОКОСТЬ
РАСЩЕПЛЕННАЯ,
ЖИВОКОСТЬ
БЕЛОЦВЕТКОВАЯ**

Delphinium albiflorum DC. 1818 [= *Delphinium fissum* Waldst. 1953]

Семейство: Лютиковые –
Ranunculaceae

Категория и статус: 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Реликтовый вид с дизъюнктивным паннонско-понтически-эвксинским ареалом [1] с сокращающейся численностью и ограниченным числом локалитетов. Красная книга СССР (1984) – «Редкий вид».



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
Включен в Красный список МСОП-1997 (IUCN Red List of Threatened Plants. Cambridge, 1997). World status: Indeterminate – I [2].

Категория согласно критериям Красного списка МСОП
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable – VU C2a(i); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика
Травянистый поликарпик. Высота – до 60 см. Стебли внизу голые,верху железисто-пушистые. Листья пальчато-рассеченные на узкие доли. Цветки фиолетовые в густой многоцветковой кисти [1].

Распространение
Общий ареал: Средиземноморье (Балканы); Восточная Европа (Молдова, Южные Карпаты, Горный Крым); Кавказ [1] (Абхазия в долине р. Лашипсе) [3]. Россия: Северный Кавказ (КК). Краснодарский край: Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-н (Шахгиреевское ущелье р. Малая Лаба, балка Капустина, кордоны Черноречье, 3-я Рота) [4, 5]; Западное

Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (ущелье Ахцу [1, 6], верховье р. Мзымта, по пойме среди высокотравья, оз. Кардывач, хр. Аишха [6]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в июне – июле. Размножение семенное. Растет на каменистых участках субальпийского пояса. В ущелье Ахцу и в Шахгиреевском ущелье растет на скалистых карнизах в лесном поясе в окружении широколиственных пород.

Численность и ее тенденции

В Шахгиреевском ущелье встречается небольшими группами и одиночно [4], в ущелье Ахцу близок к исчезновению, сохранились единичные экземпляры, в окр. оз. Кардывач исчез, осталась небольшая ценопопуляция на левом берегу р. Мзымта в урочище Азмич. На хр. Аишха локально многочислен, выступает эдификатором субальпийского высокоотравья [6].

Лимитирующие факторы

Взросшее рекреационное освоение долины верхнего течения р. Мзымта, сбор на букеты, нарушение условий произрастания, вытаптывание, выжигание.

Меры охраны

Был занесен в первое издание КККК как вид, находящийся под угрозой исчезновения (категория II) [7]. Охраняется на территории СНП, КГПБЗ. Места плотного произрастания вида на хр. Аишха желательно включить в состав СНП [6]. Был рекомендован к включению в Красную книгу РФ [8]. Необходимы изучение географического распространения вида в регионе, контроль за состоянием популяций, ограничение хозяйственной деятельности в местах произрастания.

Источники информации

1. Красная книга СССР, 1984; 2. IUCN Red List... 1997; 3. Рицинский, 2005; 4. Тимухин, 2000b; 5. Туниев, Тимухин, 2002; 6. Данные составителей; 7. КККК, 1994; 8. Тимухин, 2000a.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.