


КРАСНАЯ КНИГА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(ЖИВОТНЫЕ)

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007



черной полосы на лбу, соединяющейся с полосами, проходящими через глаза.

Распространение

Глобальный ареал включает практически всю Палеарктику от Канарских островов до Чукотки и Курильских островов, от лесотундры до Сахары, Аравии, Ирана; отдельные популяции гнездятся южнее Сахары в тропиках, а также на севере Индии; населяет лесотундру и тайгу Северной Америки. В пределах ареала распространен спорадически, не гнездится на обширных территориях Центральной и Восточной Азии [7]. В РФ встречается от западных границ России к востоку до Чукотки, северного и западного побережий Охотского моря. К северу до северного побережья Кольского полуострова, устьев рек Печора, Обь, Таз; в долине р. Хатанга до 68° с. ш., в междуречье Лены и Индигирки до 71° с. ш., до низовьев р. Колымы. К югу западнее р. Волги до 51° с. ш., восточнее Каспийского моря к югу до границ России, между оз. Байкал и Охотским морем граница проходит в северной части Витимского плоскогорья и Станового хр. [14]. Региональный ареал является областью зимовок вида, включает всю равнинную и горную (до среднегорья включительно) части края [1, 3–6, 10–12, 15, 16, 19]. В крае на зимовке встречаются два подвида: *L. excubitor* и *L. excubitor homeyeri* Sabanis, 1873 [12]. Сведения о гнездовании серого сорокопута в Славянском [17] и Динском р-нах [11] не подтверждены документально. Данные о встречах в летний период на Таманском полуострове [8], в окрестностях Краснодара [4], в долине р. Малая Лаба [9] требуют дальнейшего изучения.

Особенности биологии и экологии

Гнездовой период длится с апреля по август. Гнездо устраивает на ветвях деревьев на высоте до 20 м. В кладке 3–8, чаще 5–7 яиц. В гнезде птенцы находятся около 17–20 суток [2, 13]. В КК на зимовке появляется с середины октября и находится до конца марта. На равнине встречается на открытых пространствах с отдельно стоящими деревьями или их группами, в лесном поясе обитает по опушкам леса, полянам до зоны смешанных лесов [1, 10, 12, 15, 16, 19]. Держится одиночно. В качестве присад использует верхушки деревьев и кустарников, присаживается на провода ЛЭП. В питании на территории КК отмечены полевая мышь (*Apodemus agrarius*), сверчки, жуужелицы (*Carabus*) [3], хохлатый жаворонок (*Galerida cristata*) [6], также была отмечена охота серого сорокопута на большую синицу (*Parus major*), полевого жаворонка (*Alauda arvensis*), дятла (*Turdus viscivorus*) [19].

Численность и ее тенденции

Данные о численности отсутствуют. Наиболее обычен *L. excubitor excubitor* в Окском заповеднике, где на площади 230 км² обитает 50 пар [2]. В КК общая численность неизвестна, в литературе представлена информация об отдельных встречах птиц в различных частях края [1, 3, 6, 10, 12, 15, 16, 19]. Специальный учет не проводился.

Лимитирующие факторы

Не изучены.

Необходимые и дополнительные меры охраны

Проведение учетов в различных биотопах края в зимний период. Ведение разъяснительной работы о статусе вида.

Источники информации

1. Аверин, Насимович, 1938; 2. Бутьев, Мищенко, 2001; 3. Емтыль и др., 1994; 4. Емтыль и др., 1996; 5. Жарова, Жаров, 1962; 6. Заболотный, Хохлов, 1997; 7. Коблик, 2001в; 8. Лохман и др., 2005; 9. Маркитан, 1997; 10. Мнацеканов, 1999б; 11. Найданов И. С., Найданов А. С., 2002; 12. Очаповский, 1967а; 13. Портенко, 1960; 14. Степанян, 2003; 15. Тильба, 1999а; 16. Тильба, 2001а; 17. Хохлов и др., 2006; 18. IUCN, 2004; 19. Неопубликованные данные составителя.

Составитель

Р. А. Мнацеканов.

322. БЛЕДНАЯ ПЕРЕСМЕШКА

Hippolais pallida (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

Систематическое положение

Семейство славковые — Sylviidae.

Статус

2 «Уязвимый» — 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» — Least Concern, LC ver. 3.1 (2001) [7].

Категория согласно критериям Красного Списка МСОП

Региональная популяция относится к категории «Уязвимые» — Vulnerable, VU Bab(iii); D1. Р. А. Мнацеканов, П. А. Тильба.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание


Птица немного крупнее пеночки, с буровато-серым верхом и светлым низом. Клюв более длинный, у основания телесного цвета.

Распространение

Глобальный ареал: Северная Африка, Юго-Восточная Европа, Передняя Азия. В РФ встречается на Черноморском побережье, в восточном Предкавказье [5]. В КК этот вид относится к гнездящимся перелетным птицам. Региональный ареал представляет собой узкую полосу Черноморского побережья от пос. Лоо до границы с Абхазией [4, 6]. На пролете отмечен на Таманском полуострове [2].

Особенности биологии и экологии

Населяет куртины древесной растительности, кустарники в прибрежной полосе моря и в приустьевых участках рек, а также участки зеленых насаждений в населенных пунктах. Появляются бледные пересмешки на местах гнездования в конце апреля. Отлет завершается во второй половине сентября [6]. Гнезда птицы устраивают в кустарниках. В кладке 4–5 яиц. Питаются мелкими насекомыми [3].



Численность и ее тенденции

В южном регионе России численность бледной пересмешки составляет 20–50 тыс. пар [1]. В пределах КК малочисленный вид, находящийся в уязвимом положении. Динамика численности вида не изучена. Общая его численность, по экспертной оценке, не превышает 200–300 пар.

Лимитирующие факторы

Уничтожение кустарников в прибрежной полосе, расчистка берегов водоемов, что приводит к сокращению площадей гнездовых биотопов вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны

Создание ООПТ в местах расположения гнездовых группировок птиц, в том числе на Имеретинской низменности, где отмечается регулярное гнездование бледной пересмешки.

Источники информации

1. Белик, 2005; 2. Лохман, и др., 2004; 3. Птицы Советского Союза, 1954б; 4. Степаян, 1969; 5. Степаян, 2003; 6. Тильба, в печати; 7. IUCN, 2004.

Составитель

П. А. Тильба.

323. КРАСНОГОЛОВЫЙ КОРОЛЕК

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

Систематическое положение

Семейство корольковые — Regulidae.

Статус

3 «Редкий» — 3, РД. Внесен в Приложение 2 к Красной книге РФ [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» — Least Concern, LC ver. 3.1 (2001) [12].

Категория согласно критериям Красного Списка МСОП

Региональная популяция относится к категории «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» — Near Threatened, NT. Р. А. Мнацеканов, П. А. Тильба.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание

Очень маленькая подвижная птица с оливково-зеленым верхом и грязно-белым низом. Хорошо выражена белая бровь, выше которой проходит черная полоса. Черная полоса тянется от угла рта через глаз к затылку. Верх головы оранжевого цвета.

