

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

## 128. КЛЕКАЧКА КОЛХИДСКАЯ *Staphylea colchica* Stev. 1848

**Семейство:** Клекачковые –  
*Staphyleaceae*

**Категория и статус:** 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Редкий третичнореликтовый кавказско-малоазиатский вид, спорадично распространенный на северной границе ареала, с небольшим числом мест произрастания и сокращающейся численностью. Красная книга РФ – категория статуса 2; Красная книга СССР – «Редкий вид».



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
Включен в Красный список МСОП-1997 (IUCN Red List of Threatened Plants. Cambridge, 1997). World status: Indeterminate (I) [1].

**Категория согласно критериям Красного списка МСОП**  
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU A2d; V1bc(i); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

**Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**  
Не принадлежит.

### **Краткая морфологическая характеристика**

Листопадный кустарник или небольшое дерево. Высота – до 5 м. Листья длинночерешковые, непарноперистые, из 3, реже 5 листочков, листочки яйцевидно-овальные или яйцевидно-продолговатые, голые или снизу по жилкам опушенные, мелкопильчатые, обычно коротко оттянуто-заостренные. Соцветия верхушечные, в виде щитковидной поникающей или прямостоячей кисти. Цветки на длинных цветоножках с линейным прицветником. Лепестки 10–14 мм длиной. Коробочка до 8 мм длиной, вздутая, с перепончатокожистыми створками, наверху с расходящимися острыми лопастями. При созревании они раскрываются, рассыпая округло-яйцевидные с твердой блестящей серой или желтовато-бурой кожурой семена, расположенные по 1–2 в каждом гнезде, яйцевидно-овальные, 5–6 мм длиной и 5–6 мм шириной [2–5].  $2n=52$ .

### **Распространение**

Общий ареал: Восточная Европа (Украина); Кавказ; Юго-Западная Азия (северо-восток) [6]. Россия: Северный Кавказ (КК; РА). Краснодарский край: Западный Кавказ: Бело-

Лабинский р-н (бас. р. Пшеха [7], Гуамское ущелье, плато Черногорье); Северо-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-н (окр. г. Новороссийска [8]); Пшадско-Джубгский р-н (окр. пос. Дефановка в пойменном лесу р. Синявка (6 особей) (19.X.2001) [9], Агойская щель, ур. Колихо [9]); Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (левый приток р. Туапсе за с. Красное (1.VI.1980), Греческая щель, скала Монах (пойма р. Пшенахо) [9], гора Ахун, ущелья Ахцу, Ахштырское и Дзыхринское, каньоны Кудепстинский и Псахский, бас. рр. Восточная и Западная Хоста, Шахе, Западный и Восточный Дагомыс, Псезуапсе, Цусхвадж, Сочи, Псахе, Кудепста, окр. пос. Солоники, Глубокая щель, по долинам рр. Ажу, Шахе до Бабук-Аула) [10, 11]).

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Летне-зеленый. Цветет в апреле – мае, плоды созревают в августе – сентябре. Опыляется насекомыми. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Мезотерм. Сциофит, мезофит. Растет в светлых лесах, по долинам рек нижнего и среднего лесных поясов, поднимается до 1500 м над у. м.

### **Численность и ее тенденции**

Растет единичными особями, реже группами.

### **Лимитирующие факторы**

Разрушение местообитаний при хозяйственном освоении приморской полосы ЧПК, рубки, дачное строительство, рекреация, пожары, сбор бутонов для квашения.

### **Меры охраны**

Охраняется на территории СНП и КГПБЗ. Необходимо соблюдение режима охраны популяций вида, изучение структуры ценопопуляций и контроль за их динамикой.

### **Источники информации**

1. IUCN Red List... 1997; 2. Зернов, 2000; 3. Колаковский, 1986; 4. КККК, 1994; 5. Красная книга РА, 2000; 6. Цвелев, 1996а; 7. Данные составителей; 8. Алтухов, Литвинская, 1986; 9. Личное сообщение, С. А. Литвинская; 10. Тимухин, 2002а; 11. Туниев, Тимухин, 2001.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото С. А. Литвинская.