

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 2 ЖИВОТНЫЕ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012



Систематическое положение
Семейство: Бородачьи – Gypaetidae.

Категория и статус

1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом «редкий вид на периферии ареала» [4]. В Красной книге СССР – к категории «1. Исчезающие виды» [2]. В Красной книге КК включен в категорию «1Б – Находящийся под угрозой исчезновения» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered, CR D. P.A. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [7].

Краткое морфологическое описание

Крупная хищная птица, размах крыльев около 2 м. Длина крыла 780 – 832 мм, вес 5 – 5,75 кг [3]. Крылья узкие, черновато-бурые; хвост длинный, клиновидный; голова, шея и нижняя часть тела рыжеватые; спинная сторона черновато-бурая с белыми стволами перьев. Глаза красные, под клювом выдвинутые вперед черные перья – своеобразная «борода». Молодые птицы однотонно бурой окраски.

Распространение

Глобальный ареал: Южная Европа, Африка, Передняя и Центральная Азия [3]. В РФ встречается на Кавказе, в Центральном и Юго-Восточном Алтае [5]. В КК населяет горные районы ГКХ, Передового и Скалистого хр. от Фишт-Оштенского горного массива до границ с Абхазией и КЧР [6]. Региональный ареал охватывает низкогорные, среднегорные и высокогорные урочища КГПБЗ и его окрестностей, где бородач относится к гнездящимся оседлым видам. Известные гнездовые участки птиц располагаются на г. Джуга, хр. Слесарня, Лагонакском нагорье.

Особенности биологии и экологии

Местами обитания является горные районы с присутствием скальных обнажений, лесной растительности, луговых или горно-степных пространств. Гнезда, представляющие собой массивные постройки, птицы устраивают на скальных обрывах в ущельях или куэстовых хребтах. Гнездовые пары придерживаются одних и тех же участков по многу лет подряд. Период размножения начинается в декабре – январе. В кладке 1 – 2 яйца. Гнездовой период длится 5,5 – 6 месяцев. Питается бородач падалью, способен заглатывать фрагменты костей, которые измельчает, сбрасывая во время полета на камни. Иногда нападает на птиц, некрупных млекопитающих.

Численность и ее тенденции

Численность глобальной популяции составляет 2 – 10 тыс. особей [8]. В 1980-х гг. в Восточной Европе обитало 120 – 150 пар [2], современные оценки свидетельствуют, что на территории Европы размножается 610 – 1000 пар бородача [8]. В России численность вида оценивается в 30 – 40 пар [5]. По другим сведениям, численность бородача в Европейской России составляет 50 – 100 [4], а в Южном регионе – 100 – 150 пар [1]. В РА численность вида остаётся стабильно невысокой и составляет 3 – 4 гнездящиеся пары.

Лимитирующие факторы и угрозы

Сокращение в конце XX в. кормовой базы в связи со снижением численности диких и домашних копытных животных. Гибель птиц в капканах, куда бородачи попадают чаще, чем другие хищные птицы – некрофаги. Отстрел взрослых птиц. Увеличение фактора беспокойства.

Необходимые меры охраны

Запрещение применения капканов для отлова наземных хищников в местах постоянного обитания птиц. Организация специальных подкормочных площадок. Мониторинг состояния вида на основе проведения регулярных учетов размножающихся пар.

Источники информации

1. Бедик, 2005;
2. Галупин, 1984а;
3. Дементьев, 1951;
4. Оценка... 2004;
5. Тильба, 2001б;
6. Тильба, Мнацеканов, 2007а;
7. СИТЕС, 2011;
8. IUCN, 2011.

Составители

П.А. Тильба,
Р.А. Мнацеканов.

