

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 1

Введение

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012

**Систематическое положение**


Семейство: Лилейные – Liliaceae [Алуудз].

Категория и статус

1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В Красной книге РФ отнесен к категории 2 – вид, сокращающийся в численности в результате сильного антропогенного воздействия [6]. В Красной книге СССР отнесен к категории «Вид, находящийся на грани исчезновения» [7]. В Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [4]. Средиземногорный, северокавказский. Эндемик Кавказа.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

**Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП**

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN A2abd. И.Н. Тимухин, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание

Многолетнее травянистое растение высотой до 115 см, с небольшими широкояйцевидными луковицами желтого цвета, до 5 см длиной. Чешуи ярко-желтого цвета плотно прилегают друг к другу. Стебель в верхней части пятнистый, довольно густо опушен короткими отстоящими волосками. Листья обратной-цевидно-ланцетные или эллиптически-ланцетные: нижние собраны в мутовку по 5 – 8, верхние – очередные, более короткие. Цветки по 5 – 8, собраны в кисть, поникающие. Листочки околоцветника вишнево-красные, с темными пятнышками, продолговатые, до 4 см длиной, суженные книзу. Тычинки в 2 раза короче листочков околоцветника. Пыльники темно-пурпурного цвета. Коробочка 6-гранная, с острыми ребрами [1 – 3].

Распространение

Общий ареал: Западный Кавказ. Россия: КК. Адыгея: р. Циде, г. Мессо [5], на границе РА с Ашперонским районом КК по трассе Майкоп – Туапсе [8].

Особенности биологии и экологии

Встречается в лесах на высоте 300 – 500 м над ур. м. [1 – 3]. Преимущественно в светлых дубовых, грабовых лесах. На границе с Ашперонским р-ном произрастает в грабовом дубняке [8]. Цветет в мае – июне, плодоносит в августе. Декоративен. Медонос [1 – 3].

Численность и ее тенденции

Как правило, встречается небольшими группами на незначительных площадях. Плотность популяций может достигать 25 экз. на 1 м². На границе с Ашперонским р-ном отмечена крупная многосотенная ценопопуляция вида [8].

Лимитирующие факторы и угрозы

Сбор и выкопка растений, рекреационное освоение территории.

Необходимые меры охраны

В РА вид охраняемыми территориями не охвачен. Необходима организация ботанического заказника на границе с Ашперонским р-ном.

Источники информации

1. Алексеев и др., 1988;
2. Колаковский, 1986;
3. Косенко, 1970;
4. Красная книга КК, 2007;
5. Красная книга РА, 2000;
6. Красная книга РФ, 2008;
7. Красная книга СССР, 1984;
8. Данные составителей.

Составители

И.Н. Тимухин,
Б.С. Туниев.