

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

126. ЛОЖНОДРОК МОНПЕЛИЙСКИЙ

Teline monspessulana (L.)Koch, 1860

Семейство: Бобовые – *Fabaceae*

Категория и статус: 1 «Находящиеся в опасном состоянии» – 1Б, УИ. Локально встречающийся средиземноморский [1] реликтовый вид с прогрессирующе сокращающейся численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории редкости «Находящаяся в опасном состоянии» – Endangered, EN Alcb; C1; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Кустарник до 2 м высотой, с бороздчато-границатыми и шелковисто-опушенными побегами и молодыми ветвями. Листья тройчатые, на коротких опушенных черешках. Листочки обратнойцевидные, до 1,5 см длиной, на верхушке округлые и с шипиком, а в основании клиновидные. Их верхняя поверхность голая, а нижняя – шелковисто-опушенная. Желтые ароматные цветки собраны по 3–9 в пазушные головки, которые образуют кистевидно-колосовидные сложные облиственные соцветия. Сравнительно небольшие бобы слегка изогнуты и опушены рыжими волосками [2].

Распространение

Общий ареал: Азорские и Канарские острова; Западная Европа (юг Франции, Монпелье); Юго-Западная Азия (Турция) [2]. Россия: КК. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (окр. г. Сочи (16.V.1895, В. Липский), окр. курортного пос. Хоста на берегу моря против тоннеля (12.V.1918, W. Steup) [3, 4], от устья р. Мацеста до мыса Видный в пос. Хоста [5], гора Ахун [6]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в мае, плодоносит в августе [6]. Гелиофит, мезоксерофит. Элемент бывшего маквиса. Растет на каменистых участках подошвы горы Ахун. Предпочитает открытые участки, но может произрастать под пологом разреженных дубняков [6].

Численность и ее тенденции

Крайне низка и продолжает сокращаться. Общая численность не превышает 300 экз. [6].

Лимитирующие факторы

Естественно редкий угнетенный вид, большая часть популяции которого была уничтожена при строительстве автотрассы Агура – Адлер.

Меры охраны

Незначительный участок входит в состав СНП. Необходимы детальное изучение вида, оценка состояния ареала, запрещение хозяйственной деятельности в местах произрастания, контроль за состоянием популяций, изучение биологии, экологии и географического распространения вида, сохранение всех известных локалитетов, разведение в питомниках с последующей реинтродукцией [6].

Источники информации

1. Гроссгейм, 1952; 2. Алексеев и др., 1997; 3. LE; 4. Косенко, 1970; 5. Тимухин, 2000; 6. Данные составителей.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото Б. С. Туниев.