

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 1

Введение

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012

АРАФЁ АРОМАТНАЯ, АРАФОЭ АРОМАТНЫЙ, ЛИГУСТИКУМ АРАФЕ

Arafoe aromatica M. Pimenov et Lavrova, 1989 [*Ligusticum arafoe* Albov, 1894]



Систематическое положение

Семейство: Зонтичные – Apiaceae.

Категория и статус

2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к категории 3 – редкий вид [4]. Реликтовый западнокавказский эндемичный вид на северной границе ареала с небольшим количеством локалитетов и сокращающейся численностью.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU C2a(f). И.Н. Тимухин, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание

Многолетник. Стебель одиночный или их несколько, прямостоячие, короткоопушенные мелкорребристые, 70 – 170 см высотой [2]. Прикорневые листья простые, сердцевидно-округлые или тройчатые, стеблевые тройчато-раздельные, с крупными листочками [1]. Нижние стеблевые листья сложные – из 3 листочков, сходные с прикорневыми листьями и также на длинных черешках. Верхние листья более мелкие на коротких черешках, расправленных во влагалище. Все листья сверху голые, зеленые, снизу серовато-опушенные. Зонтики с 24 – 40 лучами [3], обертка из 5 – 11 неравных, линейных листочков. Лепестки белые, наверху выемчатые, на спинке опушенные. Корневище ароматное.

Распространение

Общий ареал: Кавказ. Россия: юг КК и РА. Адыгея: Фипт-Оштенский массив [5, 6], г. Мурзикау, приют Цица [7].

Особенности биологии и экологии

Произрастает на субальпийских и альпийских лугах до 2000 м над ур. м. Северокожидский, литофильный, альпийский. Цветет в июле – сентябре [3].

Численность и ее тенденции

Встречается небольшими группами, реже единичными растениями.

Лимитирующие факторы и угрозы

Невысокая плотность популяции.

Необходимые меры охраны

Охраняется на территории КГПБЗ. Необходим контроль за состоянием местообитаний и популяций.

Источники информации

1. Фроссгейм, 1949;
2. Колаковский, 1986;
3. Косенко, 1970;
4. Красная книга РФ, 2008;
5. Тимухин, 2006;
6. Данные составителей.
7. Гербарий КГПБЗ.

Составители

И.Н. Тимухин,
Б.С. Туниев.

