

Чеглок

Falco subbuteo Linnaeus (F. s. *subbuteo*)

Немногочисленный вид, но распространен широко. Занесен в «Красную книгу» БССР.

Поселяется чаще всего в разреженных смешанных и сосновых лесах. Сплошных массивов избегает. Гнездится близ опушек, в перелесках между полями, на отдельных деревьях среди обширных вырубок, нередко — в чистых высокоствольных сосновых борах по окраинам лесного массива или около крупных просек. Непременным условием для гнездования является наличие поблизости широких речных пойм, озерных котло-

Чеглок

ВИН, мелиорированных болот, полей и лугов — основных мест охоты птицы. В северной части республики встречается на верховых болотах.

Селится отдельными парами в старых гнездах серых ворон, ворона, реже — грача, хищных птиц (осоеда), сооруженных на соснах, а в южной зоне — также на дубах, на высоте от 3 до 32 м, у самой вершины, на боковых ветвях (иногда в «ведьминых метлах»). Одно гнездо может использовать ряд лет (до 4 и более), достраивая его и несколько изменяя лоток. В результате постройка становится более плоской. Строительным материалом при этом служат сухие сосновые веточки, зачастую с примесью можжевельного лыка, веточек лиственных деревьев. К концу гнездового периода в лотке появляются пух и перья птицы, а также ее жертв (других птиц), крылья крупных стрекоз.

В полной кладке обычно 3, реже 2 или 4 яйца. Скорлупа мелкозернистая, розово- или Краснова-

то-светло-коричневая либо коричневато-охристая, вначале матовая, а к концу насиживания — с заметным блеском. Основной более светлый фон ее, как правило, почти не виден из-за множества мазков, пятнышек, черточек, обычно очень мелких и приблизительно одинаковой величины. Окраска их варьирует от бурого, черновато-бурого до розово-коричневого, охристого и охристо-коричневого цвета. В отдельных случаях они концентрируются на одном конце яйца в виде темной шапочки.

Откладывание яиц начинается чаще всего в последних числах мая — в первой половине июня, в южных районах республики, как правило, несколько раньше. В году бывает один выводок. После гибели кладки возможно повторное гнездование (яйца находили в начале и даже в конце июля). Насиживает в течение 28 суток преимущественно самка. Самец сменяет ее ежедневно лишь на короткое время.

Я: $G = 24; g = 1,85 (1,48 — 2,25)$

БССР (9)		Европа (226)	
40,57X33,29	X	42,28X32,93	
43,5X35,3	max	46,0X34,4 43,0X36,0	
38,4X33,6 40,4X31,7	min	30,8X31,4 40,4X29,0	
30.05.83	3	Брагинский	A
03.06.46	?	Гомельский	25
07.06.81	3	Вилейский	A
12.06.61	3	Городокский	6
16.06.78	1	Мядельский	И
22.06.78	3[©]	»	11
28.06.66		2? Городокский	6
04.07.75	4⁰	Столбцовский	A
07.07.56		2 Каменецкий	9
09.07.75	2[®] + 16.	Столбцовский	A
11.07.74		»	A
31.07.52	3[©]	Каменецкий	9
02.08.52		3 »	9