

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007


## 246. ПАЛЬЦЕКОРНИК ЖЕЛТОВАТЫЙ

*Dactylorhiza flavescens*

(С. Koch) Holub, 1976

**Семейство:** Ятрышниковые –  
*Orchidaceae*

**Категория и статус:** 3 «Редкий» – 3,  
РД. Спорадично распространенный вид  
с ограниченным количеством мест про-  
израстания и сокращающейся числен-  
ностью.



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

### **Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

### **Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) (2006) [1].

### **Краткая морфологическая характеристика**

Корнеклубневый травянистый поликарпик. Высота – 35 см. Клубень удлинённый, на конце коротко лопастный. Стебель при основании с двумя беловато-буроватыми влагалищами. Листья скучены в нижней части стебля в количестве 5–10, линейные, длиной 8–12 см, шириной до 1,5 см, тупые. Колос коротко цилиндрический, до 8 см длиной, густой, многоцветковый. Прицветник 2–3 см длиной. Листочки околоцветника отогнутые, палево-желтые, беловатые или пурпурные. Губа 5–7 мм длиной, коротко-трехлопастная, средняя лопасть квадратная, часто с выемкой на конце. Шпорец длиной 7–10 мм, немного длиннее губы.

### **Распространение**

Общий ареал: Азия: Юго-Западная (восточная Турция, северный Ирак, северо-западный Иран), Средняя (Туркменистан: Копетдаг); Кавказ (Закавказье) [2, 3]. Россия: КЧР; СК; КК; РА (гора Лохмач [4, 5]). Краснодарский край: Северо-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-н (хр. Маркотх у г. Геленджика и пос. Кабардинка, гора Лысая) [6]; Пшадско-Джубгский р-н (окр. с. Молдавановка) [7]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н: горы Бекишей (8.VI.2004, И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев) [8], гора Лысая

(16.V.2004, И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев), Ачишхо у Хмелевских озер (17.VI.2004, И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев), гора Семиглавая [5], мыс Кадош у г. Туапсе [6]).

#### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Цветет в мае, плодоносит в июне [3, 9, 10]. Мезофит, сциогелиофит, микротерм. Почва горно-луговая. Растет на субальпийских и альпийских лугах, в криволесьях, по опушкам и лужайкам.

#### **Численность и ее тенденции**

В местах произрастания растет незначительными группами, от 20 до 150 экз. [5]. Ценопопуляция на западном склоне горы Лохмач локальна, занимает площадь около 1 га. На площадке 10 м<sup>2</sup> – vv:g – 31:12. Преобладание взрослых виргинильных особей свидетельствует о том, что ценопопуляция является левосторонней и неполночленной [11].

#### **Лимитирующие факторы**

Естественно редкий вид на северо-западной границе ареала. Рекреационный пресс на горе Ачишхо, выпас скота.

#### **Меры охраны**

Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. Необходимы контроль за состоянием популяций, соблюдение режима охраны, запрет сбора в естественных местообитаниях в качестве декоративного и лекарственного растения, ограничение хозяйственной деятельности в местах произрастания, введение в культуру.

#### **Источники информации**

1. [www.cites.org](http://www.cites.org), 14.06.06; 2. Аверьянов, 2006; 3. Вахрамеева и др., 1991; 4. Тимухин, 2003а; 5. Данные составителей; 6. Зернов, 2000; 7. Личное сообщение, С. А. Литвинская; 8. Тимухин, 2005; 9. Галушко, 1978; 10. Косенко, 1970; 11. Тимухин, 2003d.

#### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев, фото И. Н. Тимухин.