

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

58. ЗВЕРБОЙ КУСТАРНИКОВЫЙ

Hypericum xylosteifolium

(Spach) N. Robson, 1967

[= *H. inodorum* Willd. 1800]

Семейство: Зверобойные –
Hypericaceae, Guttiferae

Категория и статус: 2 «Уязвимый» –
2, УВ. Кавказско-балкано-малоазиатский реликтовый вид с сокращающейся численностью, спорадично распространенный в небольшом числе мест произрастания.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU A1c; B1bc(i,ii); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Листопадный кустарник. Высота – до 1 м. Ветви голые, угловатые, желто-бурые, побеги несколько двукрылые, густооблиственные. Листья яйцевидно-эллиптические, продолговатые или продолговато-ланцетные, супротивные, длиной 15–50 мм и шириной 4–17 мм. Цветки – в верхушечных полусонтиках, обоеполые. Прицветники от ланцетных до шиловидных. Чашелистики продолговатые или продолговато-ланцетные, по краю с железками и без них, длиной в среднем 6 мм. Лепестки линейно-продолговатые, в 2 раза длиннее чашелистиков. Тычинки срослись в 5 пучков, равны по длине лепесткам; столбиков 3. Плод – трехгнездная коробочка с многочисленными продольными железистыми полосками [1, 2]. 2n=40.

Распространение

Общий ареал: Юго-Западная Азия (север Турции); Средиземноморье (Балканский п-ов); Кавказ (Западное Закавказье). Россия: Северный Кавказ: КК. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (ущелье р. Сочи, окр. с. Верхняя Николаевка, тиссосамшитовая роща [3], бас. р. Восточная Агура (18.VIII.1930, автор ?), ущелье Краснопо-

лянского шоссе (3.VI.1924, W. Steup), ущелье р. Сочи, склон горы Кума (29.III.1987, Е. Мордак) [4]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Летне-зеленый. Цветет в мае – июне. Энтомофил. Размножается семенами. Мезофит, теневыносливый вид, мезотерм. Произрастает в нижнем и среднем лесном поясе до 1200 м над у. м. в дубовых и буково-грабовых лесах, часто образует хорошо выраженный подлесок. Особенно характерен для каменистых склонов в скально-лесных комплексах. Декоративен. Медонос [1, 2].

Численность и ее тенденции

Выступает эдификатором подлеска дубняков зверобойных. Общая площадь произрастания в РФ не превышает 10 га.

Лимитирующие факторы

Интенсивное освоение предгорий г. Сочи.

Меры охраны

Рекомендовался для включения в Красную книгу РФ [5]. Все известные места произрастания в СНП рекомендованы к заказному режиму охраны [3].

Источники информации

1. Колаковский, 1982; 2. Косенко, 1970; 3. Данные составителей; 4. LE; 5. Тимухин, 2000.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото И. Н. Тимухин.