

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

226. ПАНКРАЦИЙ МОРСКОЙ

Pancratium maritimum L. 1753

Семейство: Амариллисовые –
Amaryllidaceae

Категория и статус: 1 «Находящийся в критическом состоянии» – 1А, КС. Средиземноморский реликтовый вид олиготипного рода с локальным распространением. Красная книга РФ – категория статуса 1; Красная книга СССР – «Редкий вид».



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории «Находящиеся в критическом состоянии» Critically Endangered CR A1a; D; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый луковичный поликарпик. Высота – 40–60 см. Луковица крупная, глубоко сидящая, до 10 см длиной и 6 см в диаметре, одетая темно-бурыми влагалищами, образующими наверху трубку, окружающую основание стебля. Листья линейные, 6–20 мм шириной, плоские, равны или короче стебля. Цветки одиночные или по 2–8, почти сидячие, при основании окружены 2 перепончатыми прицветными листьями. Доли околоцветника линейно-ланцетные, отогнутые, белые с зеленой срединной полоской. Привенчик с 12 острыми треугольными зубцами, короче долей околоцветника. $2n=22$ [1].

Распространение

Общий ареал: Европа: Южная, Юго-Восточная; Средиземноморье; Юго-Западная Азия (Турция) [2]; Кавказ (Аджария, Абхазия: Пицунда (22.VIII.; 4.IX.1915, Woronow) [3], с. Бомборы, Гудаута, устья рр. Кодор, Маджарки, Чороха, Поты, Кобулеты [4]). Россия: КК. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (Имеретинская низменность (36.VIII.1865, автор ?) [3], литоральная полоса правобережья р. Псоу [5], Имеретинская низменность Адлерского района г. Сочи [6–10]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в июле – августе. Цветение начинается на 5–6-й год. Плодоносит в октябре – ноябре. Размножается семенами и вегетативно. Экологически узкоспециализированный вид. Литоральный, псаммофильный [1]. Растет только на песчаных морских побережьях. На Имеретинской низменности отмечен на приморских сублиторальных песках в сообществе с мачком желтым, спаржей многолистной, выюнком полевым, синеголовником приморским, коровяком черноморским, подорожником песчаным [8, 10].

Численность и ее тенденции

В общей сложности сохранилось около 10 экз. [10].

Лимитирующие факторы

Выкопка растений, деградация пляжной полосы Имеретинской низменности.

Меры охраны

Присоединение сохранившихся участков Имеретинской низменности к СНП. Необходимы строжайший мониторинговый контроль за популяцией, охрана и прекращение хозяйственной деятельности в местообитании.

Источники информации

1. Колаковский, 1986; 2. Артюшенко, Мордак, 2006; 3. КВ; 4. Артюшенко, 1970; 5. Туниев и др., 2004; 6. КККК, 1994; 7. Красная книга РСФСР, 1988; 8. Тимухин, 2001с; 9. Туниев, Тимухин, 2002; 10. Данные составителей.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.