

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

## 206. ТЮЛЬПАН ДВУЦВЕТКОВЫЙ

*Tulipa biflora* Pall. 1776

[= *Tulipa polychroma* Stapf, 1885]

**Семейство:** Лилейные – *Liliaceae*

**Категория и статус:** 1 «Находящийся в критическом состоянии» – 1Б, УИ. Евразийский вид сухих солонцеватых степей и полупустынь. Вид был включен в Красную книгу СССР под названием *Tulipa callieri* Halacsy et Levier – статус – «Вид, находящийся под угрозой исчезновения».



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

### **Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональная популяция относится к категории редкости «Находящаяся в критическом состоянии» – Critically Endangered, CR B2ab(ii,iii,v); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

### **Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Не принадлежит.

### **Краткая морфологическая характеристика**

Луковичный травянистый поликарпик с безрозеточным побегом. Высота – 10–20 см. Стебель голый, коричневато-зеленый. Листья в числе 2, серповидно отогнутые, голые, гладкие, слегка сизые, с тусклым пурпурным окаймлением. Бутон прямостоячий, цветков 1–2(6), мелкие (1,5–2,5 см) листочки околоцветника белые, при основании желтые, наружные – с внешней стороны грязновато-фиолетовые, внутренние – с четкой зеленой срединной жилкой в полтора раза уже внутренних [2]. С внутренней стороны все листочки околоцветника белые с большим желтым пятном, составляющим половину их длины. Тычиночные нити цилиндрические; желтые пыльники в 2 раза короче нитей, с пурпурными кончиками, со слабым волосистым кольцом у основания. Коробочка почти шаровидная [2]. Завязь с коротким столбиком.  $2n=24$ .

### **Распространение**

Общий ареал: Европа: Восточная (Крым: ЮБК, с. Планерское, Карадаг [3, 4]); Азия: Юго-Западная (от восточной Турции до западного Пакистана); Средняя (Казахстан, Туркменистан) Азия [5]; Кавказ (Азербайджан, Армения). Россия: Европейская часть (восточные р-ны РО [6]; СК (Левокумский р-н, у подножия возвышенности Ергени, нижнее течение р. Кума, Манычская впадина [7]); Калмыкия; Заволжье; Нижнее Поволжье; юго-запад Сиби-

ри [6]. Краснодарский край: Западное Предкавказье: Азово-Кубанский р-н (Таманский п-ов) [8].

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Весенний эфемероид. Цветет в марте – начале апреля [4, 9]. Мезофит. Растет на каменисто-глинистых почвах, на открытых склонах холмов Таманского полуострова в сообществе с птицемлечником Гудзона, тюльпаном Геснера, бельвалией великолепной, валерианой лекарственной.

### **Численность и ее тенденции**

Известна одна популяция в регионе. Численность крайне низкая. На площадке 4 м<sup>2</sup> насчитывали до 5 экз. [8]. Динамика численности неизвестна.

### **Лимитирующие факторы**

Естественно редкий вид на юго-восточном пределе ареала, антропогенная деградация степных сообществ в связи с распашкой целинных степей, хищнический сбор цветущих растений на букеты, выпас мелкого рогатого скота, малочисленность популяций.

### **Меры охраны**

Необходимы контроль за состоянием популяции, изучение биологии и экологии, введение в культуру, запрет сбора вида на букеты, организация ботанических памятников природы или заказника на грязевых вулканах Таманского полуострова. Вне региона в России охраняется в Ростовской области [6].

### **Источники информации**

1. Талиев, 1941; 2. Абрамова и др., 1977; 3. Определитель высших растений Украины, 1999; 4. Крюкова и др., 1988; 5. Габриэлян, 2006; 6. Красная книга РО, 2004; 7. Дикорастущие... 1979; 8. Данные составителей; 9. Косенко, 1970.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото Б. С. Туниев.