

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 2 ЖИВОТНЫЕ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012

ПЁСТРЫЙ КАМЕННЫЙ ДРОЗД –***Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766) [Анэбзы, Къуршбзуущхъуэ, МывэбзууцІэ]****Систематическое положение**

Семейство: Мухоловковые – Muscicapidae [Бэдзубы, Жыкъан].

Категория и статус

1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории «Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered, CR D. Р. А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание

Птица размером со скворца, длина крыла ♂ 113–126 мм, ♀ 113–119 мм. У ♂ голова, шея и передняя часть спины серовато-голубые, задняя часть белая, верхние кроющие хвоста рыжие. Крылья черные. Грудь, брюхо и бока тела ржавчато-рыжие. ♀ со спинной стороны се-

роватая. Нижняя часть тела охристая с темными поперечными пестринами. Хвост ржавчато-рыжий [2].

Распространение

Глобальный ареал: Северо-Западная Африка, Евразия. В РФ населяет Кавказ, Алтай, северную оконечность Байкала и Баргузинского хр. [5]. В КК встречается в высокогорных районах ГКХ и в северо-западной части Черноморского побережья [6]. В РА – гнездящаяся перелетная птица. Регистрировалась только на территории КГПБЗ, на г. Джемарук и Лагонакском нагорье [7].

Особенности биологии и экологии

Местами гнездования являются участки низкотравных высокогорных лугов, чередующиеся с обнажениями горных пород, низкогорные редколесья средиземноморского типа на щебнистой почве, морские береговые обрывы. Гнезда устраивают на земле или в скалах. В кладке 4–6 яиц. Питаются дрозды насекомыми, ягодами [4].

Численность и ее тенденции

В Южном регионе европейской России численность вида оценивается в 5–15 тыс. пар [1]. В КК общая численность пестрого каменного дрозда не превышает 20–30 пар [6]. В РА относится к очень редко встречающимся видам. Чаще отмечался в пределах Лагонакского нагорья. Общая численность, по-видимому, составляет 2–3 пары.

Лимитирующие факторы и угрозы

Увеличение рекреационной нагрузки на некоторые урочища, где отмечается регулярное присутствие пестрого каменного дрозда.

Необходимые меры охраны

Уточнение современного распространения и численности пестрого каменного дрозда в республике. Ограничение рекреационной деятельности в урочищах регулярного обитания вида.

Источники информации

1. Белик, 2005;
2. Гладков и др., 1964;
3. Красная книга КК, 2007;
4. Птицы Советского Союза, 1954;
5. Степанян, 2003;
6. Тильба, 2007б;
7. Тильба и др., 2009;
8. IUCN, 2011.

Составители

П.А. Тильба,
Р.А. Мнацеканов.

