

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

270. ЯТРЫШНИК ОБОЖЖЕННЫЙ *Orchis ustulata* L. 1753

Семейство: Ятрышниковые –
Orchidaceae

Категория и статус: 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Западно-палеарктический вид с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью. Красная книга РФ – категория статуса 2.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU C2ab(i); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) (2006) [1].

Краткая морфологическая характеристика

Корнеклубневый травянистый поликарпик. Высота – 15–30 см. Корнеклубни яйцевидные, реже почти шаровидные, 1–1,7 см длиной и 0,7–1 см толщиной. Стебель с листовидными влагалищами. Прицветники по длине равны или длиннее завязи.

Листочки околоцветника 8 мм длиной, светло-лиловые с пурпурными жилками. Губа 7–9 мм длиной, бледно-розовая с пурпурными точками, задние лопасти ее узкие, линейно-лопатчатые, передние – широкие, короткие, зубчатые, с обрубленными долями средней лопасти. Шпора беловатая, 1 мм длиной, внизу согнутая. Шлем черновато-пурпуровый [2, 3].

Распространение

Общий ареал: Европа; Кавказ [4]. Россия: Европейская часть; Западная Сибирь; Северный Кавказ: КК; юг СК; КЧР (р. Джемагат, правый берег р. Эпчик) [5]; КБР (ущелье Черек Безенгийский); Северная Осетия – Алания; Чеченская Республика; Дагестан [6, 7]. Краснодарский край: Западное Предкавказье: Азово-Кубанский р-н [4]; Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-н (хр. Герпегем) [8]; Северо-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-н (п-ов Абрау [9], окр. г. Новороссийска [4]); Пшадско-Джубгский р-н [4].

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в начале лета. Размножается вегетативно и семенами. Предпочитает известняковые почвы. Растет по сухим лугам, лесным опушкам лиственных и смешанных лесов, среди кустарников, по горным склонам субальпийского пояса, до высоты 2700 м над у. м. [2, 3, 7].

Численность и ее тенденции

Крайне низка. На хр. Герпегем плотность популяции составляет 1 экз. на 1 га [8].

Лимитирующие факторы

Естественно редкий в регионе вид. На хр. Герпегем уничтожается при сенокосении и выпасе скота.

Меры охраны

Необходимы организация ботанического памятника природы на хр. Герпегем [8], контроль за состоянием популяций, запрет сбора растений, изучение биологии, экологии и географического распространения вида, снизить антропогенную нагрузку в местах произрастания.

Источники информации

1. www.cites.org, 14.06.06; 2. Галушко, 1978; 3. Косенко, 1970; 4. Аверьянов, 2006; 5. Воробьева, Онипченко, 2001; 6. Абрамова и др., 1977; 7. Красная книга РСФСР, 1988; 8. Данные составителей; 9. Флеров, 1926.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото М. Г. Вахрамеева.