

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ  
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

# **КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ  
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

## **Часть 1**

### **Введение**

# **РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ**

*ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ*

МАЙКОП  
2012

## ВОРОНОВИЯ ПРЕКРАСНАЯ *Woronowia speciosa* (Albov) Juz., 1941

37

**Систематическое положение**  
Семейство: Розовые – Rosaceae.

### Категория и статус

1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В Красной книге КК отнесен к категории «3 – Редкий» [1]. Находящийся под угрозой исчезновения, спорадично встречающийся реликтовый узкоэндемичный вид с небольшой площадью произрастания.

**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
Не включен.

**Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП**

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B2ab(i,ii,iii). И.Н. Тимухин, В.С. Туниев.

**Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания**

Не принадлежит.

### Краткое морфологическое описание

Многолетник. Все растение коротко-железисто-опушенное. Стебли прямостоячие, обычно одиночные, в верхней части разветвленные, до 80 см высотой. Прикорневые листья многочисленные, длинночерешковые, лировидно-перистые, верхняя доля их очень крупная, округло-почковидная, при основании глубоковыемчатая, по краю округло надрезано-лопастная и неравномерно двояко-зубчатая, сверху голая, снизу рассеянно прижато-опушенная или почти густо-коротко-железисто-опушенная, боковые дольки мелкие, неравные, яйцевидные. Стеблевые листья сидячие, мелкие, клиновидные, 3 – 5-раздельные, остро надрезанно-зубчатые. Соцветие щитковидное из 5 – 15 цветков. Гипантий ширококлиновидный, с вверх стоящими чашелистиками. Наружные чашелистики линейно-ланцетные, узкие, более мелкие. Лепестки золотистые, в 1,5 – 2 раза длиннее чашелистика. Плодики многочисленные, яйцевидно-продолговатые, прижато-опушенные, с голым длинным столбиком, верхний его членник длинный, опадающий, нижний прямой, остающийся, не крючковидный [2, 3].

### Распространение


Общий ареал: Кавказ. Россия: РА и КК. Адыгея: Фишт-Оптенский массив и Лагонакское нагорье, в частности, ур. Лагонаки, склоны г. Оптен [4]; истоки р. Цица, окрестности приюта Цица [6].

### Особенности биологии и экологии

Растет в верхнем лесном (на полянах) и альпийском поясах, предпочитает известняковые почвы [2]. Формирует характерные субальпийские луга – вороновники. Цветет в июле, плодоносит в августе – сентябре [5].

### Численность и ее тенденции

Локально массовый вид, но количество известных мест произрастания и занимаемая площадь невелики.



### Лимитирующие факторы и угрозы

Естественно редкий вид на границе ареала. Рекреационное освоение Лагонакского нагорья.

### Необходимые меры охраны

Охраняется в КГПБЗ. Необходимо ограничение рекреационной нагрузки в местах произрастания.

### Источники информации

1. Красная книга КК, 2007;
2. Колаковский, 1985;
3. Косенко, 1970;
4. Куранова, 2010;
5. Данные составителей;
6. Личное сообщение Т.Г. Ескиной.

### Составители

И.Н. Тимухин,  
В.С. Туниев.

