

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

**64. СРЕДИНСКИЯ БОЛЬШАЯ**  
*Sredinskya grandis* (Trautv.) Fed. 1951

**Семейство:** Первоцветные—  
*Primulaceae*

**Категория и статус:** 3 «Редкий» – 3, РД. Центрально-западно-закавказский эндемичный вид монотипного рода с дизъюнктивным ареалом [1, 2], с ограниченным количеством мест произрастания и низкой численностью. Красная книга РФ – категория статуса 3.



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

**Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

**Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Не принадлежит.

**Краткая морфологическая характеристика**

Травянистый длиннокорневищный поликарпик. Корневище мощное, горизонтальное, разветвленное. Листья прикорневые с крылатыми черешками длиной до 20 см, яйцевидные или яйцевидно-округлые, при основании почти прямо срезанные и короткоклиновидные, неправильно-городчато-зубчатые, на нижней стороне с сидячими мелкими буроватыми железками. Цветочные стрелки прямые, высотой 40–80 см, заканчивающиеся зонтиком из 15–40 цветков. Прицветники из треугольного основания острые, длиной 5–7 мм. Цветоножки неравные, до 7 см длиной. Чашечка длиной 6–9 мм, колокольчатая, до 1/3 надрезанная, с островатыми зубцами. Венчик бледно-желтый с прямостоячими продолговато-линейными, тупыми, мелковыемчатыми лопастями, равными по длине трубчатке и в 1,5–2 раза длиннее чашечки. Коробочка яйцевидно-продолговатая, в 2 раза длиннее чашечки [1, 3, 4].

**Распространение**

Общий ареал: Кавказ (Абхазия, Сванетия) [4]. Россия: Северный Кавказ (КК; КБР в ущелье Черек Балкарский, Штулу) [2]. Краснодарский край: Западный Кавказ: Бело-

Лабинский р-н [5]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (хр. Ачишхо у нижнего водопада (5.VIII.1992, А. Солодько) [6–8], гора Большая Чура [7], верховье р. Мзымта [4]). Особенности биологии, экологии и фитоценологии  
Цветет в июле, плодоносит в сентябре. Гигрофит, гелиофит, микрофит. Крптофит. Обитает на влажных альпийских лужайках, по берегам горных ручьев, у окраин тающего снега [2–4, 6].

#### **Численность и ее тенденции**

Встречается небольшими группами. Мониторинговый подсчет численности не производился.

#### **Лимитирующие факторы**

Рекреационный пресс на горе Ачишхо, низкая плотность популяции.

#### **Меры охраны**

Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. Вне региона охраняется в Кабардино-Балкарском заповеднике [2]. Необходимы поиск новых местонахождений, контроль за состоянием популяций.

#### **Источники информации**

1. Гроссгейм, 1967; 2. Шхагапсоев, Киржинов, 2005; 3. Колаковский, 1985; 4. Косенко, 1970; 5. Галушко, 1980; 6. Алтухов, Литвинская, 1986; 7. Солодько, 2000; 8. LE.

#### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.