

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007


72. ГОРЧИЦА МОРСКАЯ ЭВКСИНСКАЯ

Cakile euxina Pobed. 1953

[= *Cakile maritima* subsp.
euxina (Pobed.) Nyar. 1955]

Семейство: Крестоцветные, Капустные
– *Brassicaceae*

Категория и статус: 1 «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. Локально встречающийся реликтовый эвксинский субэндемичный вид с низкой численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B2ac(i,ii,iii); C1+2b; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый монокарпик. Высота – 10–40 см. Растение голое, стебли растопыренно-ветвистые. Листья мясистые, перисто-рассеченные, с 3–7 парами узколинейных долей. Лепестки розово-фиолетовые, 7–10 мм длиной, внезапно суженные в ноготок, превосходящий по длине пластинку. Стручочек из 2 члеников: нижний – обратнойцевидный, вздутый, односемянный или бессемянный, верхний – яйцевидно-мечевидный, 18–22 мм длиной, на коротких утолщенных цветоножках, прижатых к оси соцветия. Семена сплюснутые [1–3].

Распространение

Общий ареал: Европа: Центральная (Румыния), Южная (Болгария), Восточная (Молдова, Южная Украина, Крым); Юго-Западная Азия (Турция); Кавказ (Грузия, Азербайджан) [4]. Россия: Европейская часть: РО (побережье Таганрогского залива) [5]; Северный Кавказ (КК; Дагестан) [4]. Краснодарский край: Западное Предкавказье: Азово-Кубанский р-н (побережье Азовского моря [3], приморская грива Ейского лимана [6], Вербяная коса, коса

Чушка, Сазальникская коса, пляж у ст. Голубицкой [7], окр. Кизилташской (Бугазской) косы у Соленого оз. [8]); Северо-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-н (Суджукская коса у г. Новороссийска, Тонкий мыс в окр. г. Геленджика); Пшадско-Джубгский р-н (побережье между пос. Лермонтово и Новомихайловский) [9]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (Имеретинская низменность) [10–13].

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в мае – июне, плодоносит в июле – августе. Энтомофил. Размножается семенами. Мезоксерофит, гелиофит, псаммофит. Устойчив к засолению. Растет на приморских песках. Медонос. [1, 3].

Численность и ее тенденции

Образует небольшие парцеллы на приморских песках, но численность крайне низкая и продолжает сокращаться [13]. Численность на Вербяной косе – около 100 особей [7].

Лимитирующие факторы

Освоение пляжной полосы, рекреация, строительство дамб, выезд автотранспорта на сублитераль Имеретинской низменности [13].

Меры охраны

Необходима организация памятников природы во всех известных местах произрастания вида и создание комплексного заказника (либо присоединение к СНП) участка Имеретинской низменности от мыса Константинова до устья р. Псоу [10–12]. Вне региона охраняется в РО [5].

Источники информации

1. Гроссгейм, 1950; 2. Колаковский, 1982; 3. Косенко, 1970; 4. Дорофеев, 2003; 5. Красная книга РО, 2004; 6. Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989; 7. Личное сообщение, С. А. Литвинская; 8. Нагалецкий, Касанелли, 1999; 9. Зернов, 2000; 10. Лебедева, Туниев, 1995; 11. Тимухин, 2001b; 12. Туниев и др., 1988; 13. Данные составителей.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото С. А. Литвинская.